

Karta vědeckých informací Cutimed

**100 % pacientů dává přednost
Cutimed® Siltec® a nechtějí
pokračovat v předchozím
typu krytí.**

Bateman SD. 150 patient experiences with a soft silicone foam dressing.
Br J Nurs. 2015; 24 (12): S16, S 18-S23.



Co doporučují odborníci

Nadměrný exsudát může významně zhoršit hojení a negativně ovlivnit kvalitu života pacientů. Světová unie společností pro hojení ran (World Union of Wound Healing Societies, WUWHS) doporučuje holistický přístup, který řeší symptomy související s ranami a bere v úvahu preference pacientů¹. Snížení nežádoucích hladin exsudátu a atraumatické a méně časté výměny krytí jsou klíčovými faktory, které významně urychlují hojení a vedou k pozitivní zkušenosti pacientů².


Klíčové faktory pro holistický přístup



Management exsudátu

Dobrá absorpce/retence vede k

- snížené maceraci
- optimální vlhkosti spodiny rány
- intaktní okolní kůži



Frekvence výměny

Atraumatické, méně časté převazy vedou k

- rychlejšímu hojení
- snížení rizika infekce a komplikací
- výrazné úspoře nákladů



Zkušenosti pacientů

Pozitivní zkušenost pacientů

- má pozitivní vliv na proces hojení
- vede k vyšší ochotě a schopnosti spolupracovat během léčby
- zlepšuje kvalitu života obecně

Literatura a zdroje

1. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Wound exudate: effective assessment and management. *Wounds International*, 2019

2. Bateman SD. 150 patient experiences with a soft silicone foam dressing. *Br J Nurs*. 2015; 24 (12): S16, S 18-S23

Studie


Základní informace: Observační hodnocení¹² zkoumalo léčbu 150 hospitalizovaných pacientů s akutními a chronickými secernujícími ranami pomocí řady pěnových krytí Cutimed®.

Metoda: Během 4měsíčního sledování byl každý pacient sledován po dobu 28 dnů nebo až do jeho propuštění. Ostatní péče mimo režim krytí se nezměnila. Každý pacient a zdravotní sestra dostali k tomuto krytí edukační leták. Po 2 a 4 týdnech byli všichni pacienti dotázáni, zda si přejí pokračovat v používání Cutimed® Siltec®. Dokumentace k hodnocení rány byla přezkoumána vždy 7. den každého ze 4 týdnů.

Výsledky: Hodnocení ukázalo celkové zlepšení v managementu exsudátu, snížení macerace, atraumatické aplikace a odstranění krytí, snížení frekvence převazů a lepší zkušenosti pacientů. Vysoká hladina exsudátu se snížila o 96 % a průměrná frekvence výměny se prodloužila z 6–12 na 72 hodin. Všichni pacienti vyjádřili přání pokračovat s tímto produktem a nechtěli se vracet k dříve používaným krytím.


Souhlas
pacienta
100 %

Celkové pozitivní zlepšení



Před přechodem na Cutimed® Siltec® byla většina ran charakterizována vysokou a střední hladinou exsudátu.


Po 4 týdnech léčby byla vysoká hladina exsudátu méně než jedno procento. Většina ran měla nízkou hladinu exsudátu nebo již neprodukovala žádný exsudát.



Průměrná doba mezi převazy se s Cutimed® Siltec® prodloužila z 6–12 hodin ve fázi před hodnocením na 24–48 hodin po 2 týdnech a na 72 hodin po 4 týdnech.

Další informace

Úplné znění původní studie najdete na Pub.Med.



Závěr pro klinickou praxi

Cutimed® Siltec® splňuje holistický přístup WUWHs k managementu exsudátu. Krytí má nejen celkově pozitivní vliv na management exsudátu, snížení macerace, neadherenci, atraumatické aplikace a odstranění a prodloužení doby mezi převazy, ale také vede ke 100% spokojenosti pacientů.

